

428 Verdecillo



Verdecillo. Verano. Adulto. Macho (16-V).


VERDECILLO (*Serinus serinus*)

IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Dorso de color amarillento, teñido de pardo; vientre blanco, con estrías; obispillo amarillo; pico ancho y corto; garganta y frente amarillas en el macho, rayadas en la hembra.



Verdecillo. Diseño de ala, cabeza y cola.



Verderón



Lúgano. Hembra



Verderón serrano



ESPECIES SIMILARES

De las especies con colores verdes y amarillos el **verderón** es de un tamaño mucho mayor (14-15 cm.); la hembra del **lúgano** tiene la banda del ala más ancha y amarillo en las plumas de la cola; el **verderón serrano** no tiene estrías en los flancos o, en los juveniles, son muy tenues.


428 Verdecillo

SEXO

Machos con frente, garganta y pecho amarillo y sin listas; **hembras** con frente listada, garganta y pecho blanco verdoso con tintes amarillentos. (**CUIDADO:** en **invierno** estos caracteres quedan atenuados). Los **juveniles** no pueden sexarse antes de su muda **postjuvenil**. **CUIDADO:** hay ejemplares intermedios (frente listada y garganta y pecho amarillos) que no se pueden sexar.



Verdecillo. Verano. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Verdecillo. Verano. Determinación de la edad. Diseño del capirote: izquierda macho; derecha hembra.



Verdecillo. Verano. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Verdecillo. Invierno. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Verdecillo. Invierno. Determinación de la edad. Diseño del capirote: izquierda macho; derecha hembra.



Verdecillo. Invierno. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

428 Verdecillo

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con aspecto parecido al de las hembras, pero son más rojizos; obispillo rayado; plumaje nuevo

1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas de la cola cambiadas (redondeadas) y retenidas (puntiagudas por desgaste) (**CUIDADO:** algunos ejemplares con muda extensa pueden cambiar todas las plumas de la cola); en el ala, dependiendo de la extensión de la muda, el límite puede estar entre las grandes coberteras, entre las coberteras primarias, en cobertera carpal y álula o entre las plumas de vuelo (**CUIDADO:** hay ejemplares que realizan una muda **postjuvenil** completa).

Adultos con las plumas de la cola (redondeadas) y ala de la misma generación.



Verdecillo. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 2º año.




Verdecillo. Determinación de la edad. Diseño de cabeza y pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Verdecillo. Determinación de la edad. Desgaste de la cola y diseño cobertoras caudales: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, terminada entre agosto y noviembre. Muda **postjuvenil** frecuentemente parcial, que incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y gran parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras y terciarias, llegando en algunos a ser una muda completa; es frecuente también cambiar el par central de la cola, si bien puede ser mudada completamente; puede durar hasta mitad de octubre dependiendo de la fecha de nacimiento.



Verdecillo. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, recibándose migrantes europeos en invierno y con tendencia de la población local de desplazarse hacia el sur fuera de la época de cría. Está repartido por toda la Comunidad faltando únicamente en las zonas deforestadas del alto Pirineo y de la Depresión del Ebro.

428 Verdecillo



Verdecillo. Verano. Adulto. Hembra (10-VI).



Verdecillo. Verano. Juvenil (06-VI).



Verdecillo. Verano. 2º año. Macho (16-V).




Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Verdecillo. Verano. Diseño de la cabeza: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Verdecillo. Verano. 2º año. Hembra (16-V).




Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).

428 Verdecillo



Verdecillo. Verano. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).




Verdecillo. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).





Verdecillo. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (16-V).

428 Verdecillo



Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (16-V); abajo hembra (10-VI).

Verdecillo. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-V); derecha hembra (10-VI).



Verdecillo. Verano. Diseño de las coberteras primarias: arriba 2º año macho (16-V); centro 2º año hembra (16-V); abajo juvenil (03-VII).



Verdecillo. Verano. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (06-VI).



Verdecillo. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (06-VI).


428 Verdecillo



Verdecillo. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (10-VI).




Verdecillo. Invierno. Adulto. Macho (10-X).



Verdecillo. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala (06-VI).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Hembra (30-IX).



Verdecillo. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala (06-VI).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Macho (10-X).



Verdecillo. Verano. Juvenil: diseño del ala (06-VI).

428 Verdecillo



Verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño del capirote: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-IX).

428 Verdecillo



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (10-X); abajo hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (10-X); arriba derecha hembra (10-X); izquierda hembra con muda extensa (30-IX).




Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (10-X); derecha hembra (30-IX).




Verdecillo. Invierno. Adulto. Diseño de las coberteras primarias: arriba macho (10-X); abajo hembra (30-IX).

428 Verdecillo




Verdecillo. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (10-X).

Verdecillo. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (10-X); derecha hembra (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala con muda poco extensa (30-IX).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (10-X).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala con muda muy extensa (10-X).



Verdecillo. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (30-IX).



Verdecillo. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala (10-X).